

Prof Dr Declau - Dr Berghmans - Dr Coen - Dr Van Ardenne – Dr Van Der Gucht – Dr Verkest

OTOPLASTIE

Inleiding

Afstaande oren komen veel voor en zijn het gevolg van een aangeboren misvorming van het kraakbeenskelet van de oorschelp. De afstaande oorschelpen kunnen chirurgisch worden gecorrigeerd. Otoplastie kan worden uitgevoerd vanaf de leeftijd van ongeveer vijf/zes jaar, bij voorkeur als het kind er zelf om vraagt.

Type verdoving

Normalerwijze gaat de ingreep door onder algemene verdoving, hoewel dit in specifieke gevallen ook onder lokale anesthesie kan.

Verloop van de ingreep

Bij de operatie wordt een snede aan de achterkant van het oor gemaakt. Het kraakbenige skelet van het oor wordt geremodelleerd en er wordt eventueel een stukje huid dat aan de achterkant van het oor overblijft als het oor dicht tegen het hoofd komt, verwijderd. De oorschelpen worden gefixeerd met inwendige draadjes.

Verband en nazorg

Gedurende 1 week zit een beschermend verband op het hoofd, een zogenaamde tulband. Het wassen van het haar en dergelijke zal dus een poosje moeten uitgesteld worden. Dit verband mag na 1 week verwijderd worden.

Ook dan is nog voorzichtigheid geboden: er kan best nog enkele weken gebruik gemaakt worden van een 'zweetband' 's nachts om te zorgen dat het oor niet dubbel ligt en het is best om gedurende 1 maand tot 6 weken geen contactsport te beoefenen. Zwemmen wordt eveneens best vermeden gedurende zes weken na de operatie.

Het komt vaak voor dat de oorschelpen nog wekenlang wat rood, gezwollen en gevoelig blijven. Geleidelijk aan zal dit verdwijnen.

Van zodra het verband verwijderd is, mag er achter het oor wel gereinigd en ontsmet worden. De huidinsnede achter het oor wordt gesloten met een zelfresorbabeerbare draad. De eindjes worden verwijderd na 1 à 2 weken.

Meestal is er geen of weinig pijn. Desnoods mag Paracetamol genomen worden.

Bij extreme pijn en nabloeden neemt u best onmiddellijk contact op met de chirurg of de dienst spoedgevallen.

Prof Dr Declau - Dr Berghmans - Dr Coen Dr Van Ardenne – Dr Van Der Gucht – Dr Verkest

Verwikkelingen

Het rechtzetten van afstaande oren heeft dezelfde risico's als elke andere operatie. De wonde kan gaan nabloeden of er kan een infectie optreden, soms met misvorming van de oorschelp als gevolg. Gelukkig komt dit bijna nooit voor. De resultaten van oor correcties zijn over het algemeen goed.

Kraakbeen is echter een weerbarstig soort weefsel dat soms de neiging heeft om terug te keren in zijn oorspronkelijke vorm. Dat de oren recht zullen blijven staan en geheel symmetrisch zullen blijven, kan daarom nooit voor 100 % worden gegarandeerd. Soms is het noodzakelijk om nog een bijkomende correctie uit te voeren. Zelden ontstaat er reactie op de inwendige fixatiedraden. Soms is het noodzakelijk een of meerdere draden te verwijderen.

Opsomming van de risico's en of complicaties is niet limitatief.

Heeft u nog vragen stel ze dan gerust aan uw NKO-arts. U kunt hiervoor contact opnemen met de dienst NKO:

Sint-Vincentius: 03 283 1500

Sint-Jozef: 03 444 1211

Voor meer informatie kan u terecht op onze website www.neuskeeloren.be .

Prof Dr Declau - Dr Berghmans - Dr Coen Dr Van Ardenne – Dr Van Der Gucht – Dr Verkest