

Prof Dr Declau - Dr Berghmans - Dr Coen - Dr Van Ardenne – Dr Van Der Gucht – Dr Verkest

Tonsillectomie (verwijderen van de keelamandelen): volwassenen

Het lichaam bezit een uitgebreid systeem om infecties te bestrijden, het zogenaamde lymfkliersysteem. De overgang van mond en neus naar de keel bevat, als een soort ring, veel van dit lymfklierweefsel. Het vangt binnendringende ziekteverwekkers zoveel mogelijk op en maakt ze onschadelijk.

De amandelen vormen maar een klein gedeelte van het lymfkliersysteem van het lichaam. Eventuele verwijdering van de amandelen heeft daarom geen merkbare gevolgen voor de afweer.

Voorbehoud

Als U ziek bent (temperatuur hoger dan 38 ° C), dan kan de behandeling helaas niet doorgaan. We verzoeken u de behandeling dan af te bellen en een nieuwe afspraak te maken, zodra U hersteld bent. U kunt hiervoor bellen naar het secretariaat van de dienst NKO, campus St-Vincentius (03 2831500) of campus St-Jozef (034441211).

Voor de ingreep

Daar de ingreep gebeurt onder algehele narcose dient men de dag van de ingreep volledig nuchter te zijn (vanaf 0u00). Voor deze ingreep wordt U één nacht opgenomen in het ziekenhuis.

Operatie

De ingreep vindt plaats tijdens een kortdurende, maar volledige narcose. De operatietechniek die gebruikt wordt, staat bekend als 'amandelen pellen'. Hierbij worden de keelamandelen nauwkeurig los geprepareerd van de onderliggende weefsel laag ('uitgepeld'). Amandelen verwijderen geeft een tijdelijke bloeding. Deze bloeding wordt meestal snel gestopt door voldoende tamponade. De keelamandelen kunnen in principe volledig worden weggehaald, soms groeit er echter vanaf de tongamandel nog een restje uit. Op het einde van de ingreep als er geen bloeding meer is, wordt de patiënt wakker gemaakt en naar de uitslaapruijnte (recovery) gebracht.

Eventuele complicaties

Bij iedere operatie, ook bij het verwijderen van amandelen, is er sprake van enig risico. In dit geval wordt het risico voornamelijk gevormd door de mogelijkheid van nabloeding (1,37 %). Dit verklaart, waarom een normale bloedstolling bij deze ingreep zo belangrijk is. Er mogen dus van tevoren en ook de eerste dagen na de operatie géén medicijnen worden ingenomen, die de stolling nadelig beïnvloeden. Met name dus géén pijnstillers die acetylsalicylzuur bevatten

Prof Dr Declau - Dr Berghmans - Dr Coen - Dr Van Ardenne – Dr Van Der Gucht – Dr Verkest

(Aspirine, Acetosal, etc.). Een nabloeding kan optreden van onmiddellijk na tot 14 dagen na de ingreep. Soms vergt een nabloeding een heringreep met stelpen, elektrisch dichtbranden van de bloedingshaard, eventueel overhechten van de amandelloge, en uitzonderlijk afbinden van bloedvaten.

Manipulaties met instrumenten in de mondholte kunnen kleine wondjes aan de tong of lip veroorzaken en soms kan zelfs een tand losgewrikt worden.

Tijdens of onmiddellijk na de ingreep kan u slijm en bloed inademen, wat kan leiden tot een longontsteking, met nood aan een medische behandeling.

Uitzonderlijk kan een infectie vanuit het wondbed optreden. Dat kan leiden tot een abces in het halsgebied met pijn, hoge koorts en zwelling ter hoogte van de hals.

Andere, zeldzame complicaties zijn o.a. onvoldoende afsluiting van de neusholte door het verhemelte met als gevolg luchtverlies via de neus bij het spreken en eventueel terugvloeien van voedsel naar de neus; vergroeiingen in het operatiegebied; beschadiging van de buis van Eustachius en smaakverlies.

Opsomming van de risico's en of complicaties is niet limitatief.

Na de operatie

Wanneer de *keelamandelen* zijn verwijderd, moet U zeer frequent drinken, daar dit de wondgenezing bevordert. U kan zich de eerste paar dagen na de operatie nog wel wat ziek voelen. Eten en praten kunnen pijnlijk zijn. Deze pijn, die vaak uitstraalt naar de oren en dan abusievelijk voor oorpijn wordt aangezien, reageert meestal goed op medicatie. Om de pijn na een operatie aan de keelamandelen te behandelen raden wij U aan om overdag tot maximaal 4 x/dag Dafalgan Forte bruistabletten te gebruiken en s 'avonds voor het slapengaan één suppo Voltaren 100 mg op te steken.

Als alternatief hiervan kan 3x daags Diclofenac 50 mg ingenomen worden. Uw arts zal de pijnbehandeling met U bespreken en deze medicatie zo nodig voorschrijven.

Grijs beslag

Op de plaats van de verwijderde amandelen ontstaat een grijswit beslag; dat is normaal en geen teken van ontsteking. Het geeft soms een vieze smaak in de mond en de geur uit de mond kan daardoor ook enkele dagen een beetje weeïg ruiken. Dit beslag verdwijnt na ongeveer een week. Soms gaat dat gepaard met een lichte bloeding. Het opgeven van wat slijm met wat donker/zwart bloed is niet erg. Als U echter veel donker / zwart braaksel of vers bloed opgeeft, waarschuw dan direct een NKO-arts of de dienst spoedgevallen.

Prof Dr Declau - Dr Berghmans - Dr Coen - Dr Van Ardenne – Dr Van Der Gucht – Dr Verkest

Koorts en hoesten

De eerste dagen kan een lichte temperatuursverhoging optreden, tot 38,5° C. Bij koorts of hoesten langer dan 2 dagen is het verstandig de huisarts of de NKO-arts te waarschuwen.

Nabloeding

Een complicatie van de behandeling kan onder meer een nabloeding zijn, waardoor een nieuwe opname en een eventuele operatie noodzakelijk zijn. Bij een bloeding uit de neus of mond moet U **direct** contact opnemen met de dienst NKO, ofwel op de campus St-Vincentius (03 2831500) of de spoedgevallen (03 2852000), ofwel met de campus St-Jozef (03 4441211).

Slapen

De eerste 24 uur na de ingreep slaapt U best niet alleen.

Voedsel

Gebruik zacht voedsel, koud of lauw. De dag na de ingreep mag u al soep, puree en een ei geven. Geef de eerste dagen geen bruisende limonades, sinaasappelsap, citroensap of tomatensap; dat is te pijnlijk voor de wond. Vermijd ook melkproducten: dit geeft teveel slijmen in de mond. Op de derde dag mag U alweer brood eten, maar dan wel zonder korstjes. Geleidelijk kunt u het menu uitbreiden tot het normale menu. Als U al eerder ‘normaal’ wil eten, is daar geen bezwaar tegen.

Gebruik bij het tanden poetsen geen tandpasta omdat dit prikt in de keel

Drinken

De eerste dagen na de operatie regelmatig laten drinken, dat houdt de keel schoon. Drie maal een klein slokje is beter dan eenmaal een grote. Koude vloeistoffen, zoals limonade en ijs worden het best verdragen. Waterijsjes zijn prima. Vermijd zure en koolzuurhoudende dranken en melkproducten.

Werk

Blijf gedurende een paar dagen binnen. In het algemeen bent U na 10 tot 14 dagen weer voldoende opgeknapt om te gaan werken.

Zwemmen

Zwemmen mag pas twee weken na de operatie.

**DIENST
NEUS-KEEL-OREN
GELAAT - EN HALSHEELKUNDE**



Prof Dr Declau - Dr Berghmans - Dr Coen Dr Van Ardenne – Dr Van Der Gucht – Dr Verkest

Controle

Controle door de NKO-arts vindt plaats 1 tot 2 weken na de ingreep, tenzij anders wordt afgesproken.

Heeft u nog vragen stel ze dan gerust aan uw NKO-arts. U kunt hiervoor contact opnemen met de dienst NKO:

Sint-Vincentius: 03 283 1500

Sint-Jozef: 03 444 1211

Voor meer informatie kan u terecht op onze website www.neuskeeloren.be .

Prof Dr Declau - Dr Berghmans - Dr Coen Dr Van Ardenne – Dr Van Der Gucht - Dr Verkest